

# LES BRÈVES DE L'O.S. BLONDE

## ÉVOLUTION DU CHEPTEL FRANÇAIS

Les chiffres de fin 2015 du cheptel français sont tombés. Avec 3 700 000 vaches, le cheptel laitier poursuit son recul et a perdu 42 000 têtes en une année. Le troupeau viande s'établit quant à lui à 4 110 000 vaches et a progressé de 62 000 femelles.

Au niveau des abattages, il s'est abattu en 2015 :

- 995 000 vaches laitières (27 % du cheptel en rotation), soit 7 % de plus qu'en 2014,
- 699 000 vaches viande (17 % de taux de renouvellement), un chiffre tout à fait comparable à l'année précédente,
- 208 500 JB laitiers ont pris le chemin de l'abattoir (+ 2 %) et 613 000 JB viande (- 1 %).

## ANOMALIES BOVINES : DÉTECTER, COMPRENDRE, ÉRADIQUER

L'apparition d'anomalies génétiques est inévitable. Elles existent et ont toujours existé dans toutes les races. Elles résultent de mutations aléatoires dans l'ADN. Aujourd'hui, leur compréhension voire leur éradication est facilitée par les progrès spectaculaires des outils moléculaires.

Mais le point de départ reste l'observation, la description et la déclaration de ces anomalies, sans quoi rien n'est possible !

**Un réflexe : en cas de problème, déclarez à l'ONAB (Observatoire National des Anomalies Bovines) sur le site [www.onab.fr](http://www.onab.fr) et remplissez une fiche description des anomalies.**

Ainsi aura été résolu le problème de l'axonopathie et plus récemment de la cheiloschisis [malformation du museau], qui s'avère être une anomalie chromosomique [translocation d'un nouveau type affectant la paire 6/20].

Un autre problème, parfois relaté à l'École Vétérinaire de Toulouse depuis une dizaine d'années, celui des « veaux paillassons » intéresse au plus haut point de l'ONAB. Ces veaux sont caractérisés à la naissance par :

- un poil ras très dur, dense, serré comme une brosse,
- des zones alopeciques (sans poil) et érythémateuses (rougeur) sont observées sur les membres et la face,
- des problèmes de succion,
- une coloration de robe inhabituelle (« havane clair ou chocolat au lait »).

Ces symptômes conduisent rapidement à la mort de l'animal. L'hypothèse d'un déterminisme génétique est très fortement suspectée mais il y a très peu de cas déclarés... Si vous avez été confrontés à ce type de problème, merci de nous le faire savoir.


## LA SPÉCIALISATION DES CHEPTELS EN MARCHÉ

Même si la taille moyenne des cheptels inscrits de race Blonde d'Aquitaine reste inférieure à celle des autres grandes races allaitantes, il n'en reste pas moins que le nombre de grands cheptels ou très grands cheptels ne cesse d'augmenter. La spécialisation des troupeaux est bel et bien en marche...

Ainsi sur le dernier exercice, si on regarde le nombre de déclarations de naissance (DN), on dénombre 67 cheptels sur 1 100 à plus de 100 DN et 21 à plus de 150. Ces 88 cheptels (8 % du total des troupeaux) représentent le quart des DN du Livre.

Quelques départements semblent se démarquer avec plus de 5 cheptels concernés ; même si le phénomène est présent sur toute la France.

### La spécialisation des cheptels en marche :



Département	Nbre de troupeaux
Vendée	10
Loire-Atlantique	9
Deux Sèvres	8
Aveyron	5
Tarn	5
Lot-et-Garonne	5